

Open Acces



Revisió científica:

M. Teresa Sellarés,
Oftalmologia Parc Taulí
Sabadell

Revisió editorial:

Grup d'Educació
Sanitària de la CAMFiC

Correcció lingüística:

Quasar Serveis d'Imatge

Il·lustracions:

M. Teresa Sellarés

Despreniment de vitri posterior

Núria Domedel i Julieta Stefani

L'ull humà té forma esfèrica. Per fora consta de diverses capes que li permeten mantenir l'estructura, rebre nutrients i captar la llum per veure imatges. Per dins, i en contacte estret amb la capa més interna (retina), l'ull està ple d'una substància espessa i transparent anomenada *humor vitri*. A vegades, aquest gel s'enterboleix i degenera, perd volum, es desprèn de la retina i causa el **despreniment de vitri posterior**. Si l'humor s'altera encara més, podria arribar a tibar la retina cap endins, esquinçar-la i provocar un despreniment de retina.

Quan l'he de sospitar?

El principal símptoma del despreniment de vitri és la visió sobtada i persistent de taques negres petites que es mouen quan es mou l'ull i que s'anomenen *mosques volants*. En alguns casos, també poden aparèixer petits *flaixos* de llum. Ara bé, és indolor i no comporta pèrdua de visió.

Quins factors l'afavoreixen?

La gran majoria dels casos es deuen a l'envelliment normal, però també s'associa a altres circumstàncies, com la miopia, la cirurgia ocular o els traumatismes per sacseig fort del cap.


Quan he d'anar al meu metge o metgessa?

La visió de mosques volants i de flaixos de llum de nova aparició o el seu empitjorament són motiu per consultar a oftalmologia en un termini breu de temps, i es farà una exploració del fons de l'ull per determinar si la retina està afectada.

He de rebre tractament?

És un fenomen benigne i en la majoria dels casos no requereix tractament ni seguiment. Només cal actuar si s'associa amb lesions de la retina. En aquest cas

pot ser necessari garantir que la lesió no s'estengui, per exemple, mitjançant un tractament amb làser.



Despreniment de vitri posterior i flòculs vitris



Flòculs vitris tal com els percep la persona

Tornaré a veure-hi com abans?

Les mosques volants acostumen a desaparèixer en qüestió de mesos, ja que el cervell s'acostuma al defecte i l'acaba ignorant de forma inconscient. De totes maneres, algunes persones noten que les mosques segueixen visibles molt de temps, especialment quan miren un fons clar, com una paret blanca o una pantalla.

Quan la persona hi pensa o si està neguitosa, pot tornar a veure les taques negres, sense que això indiqui un empitjorament.

Com citar l'article: Domedel N i Stefani J.
Despreniment de vitri posterior. But At Prim
Cat 2023;41:10.