

Open Acces



Revisió científica:

Grup de Dermatologia
de la CAMFiC

Revisió editorial:

Grup d'Educació
Sanitària de la CAMFiC

Correcció lingüística:

Quasar Serveis d'Imatge

Il·lustracions:

Elvira Zarza


Sífilis

Elena Artal Traveria, Raquel García Trigo, Dolors Fernàndez Campi i Carme Roca Saumell

La sífilis és una infecció de transmissió sexual que pot causar problemes greus de salut si no es tracta.

La produeix un bacteri anomenat *Treponema pallidum*. La infecció pot desenvolupar-se en quatre etapes:

- 1. Sífilis primària.** Apareix una úlcera al lloc on s'ha produït el contacte. Desapareix per si mateixa en unes setmanes. No produeix dolor i, per tant, pot passar desapercibuda.
- 2. Sífilis secundària.** Apareixen unes taques a la pell o altres símptomes, com febre, ganglis, pèrdua parcial de cabell, dolors musculars o fatiga. Aquests símptomes desapareixen sols unes setmanes després.



En alguns casos, els símptomes de les sífilis primària i secundària poden ser lleus o, fins i tot, poden no notar-se en absolut.

- 3. Sífilis latent.** El bacteri roman al cos sense donar cap símptoma durant anys.
- 4. Sífilis terciària.** La majoria dels casos no evolucionen mai a la fase terciària, però, si evolucionen, amb els anys es poden danyar òrgans com el cor, el cervell o el ronyó.

Durant les fases en què el pacient està simptomàtic, pot contagiar altres persones a través de les relacions sexuals.

Com es detecta?

Es pot diagnosticar mitjançant una anàlisi de sang o bé agafant una mostra de l'úlcera.

Si s'ha passat un cop, es pot tornar a contagiar?

Sí, si es mantenen relacions sexuals sense protecció amb persones infectades de sífilis primària, secundària o latent, es pot tornar a adquirir la infecció.

Té tractament?

Sí, principalment es tracta amb injeccions d'antibiòtics. La dosi i la quantitat dependrà de l'estadi en què es faci el diagnòstic.

Per valorar l'efectivitat del tractament caldrà fer anàlisis de sang posteriors.



El tractament té algun efecte secundari?

En general es tolera molt bé. Ara bé, poden aparèixer molèsties o dolors al lloc de la punció, i vermellor o inflor. Tot això remet per si mateix. En alguns casos apareixen símptomes de refredat, mal de cap, dolors musculars o febre, que desapareixen amb repòs i algun analgèsic.

Com citar l'article:

Artal Traveria E, García Trigo R, Fernàndez Campi D i Roca Saumell C. Sífilis. But At Prim Cat 2019;37:29.