

Open Acces



Revisió científica:

Grup de Dermatologia de la CAMFiC

Revisió editorial:

Grup d'Educació Sanitària de la CAMFiC

Correcció lingüística:

Quasar Serveis d'Imatge

Il·lustracions:

Elvira Zarza

Mossegades

Sònia Martínez Carmona, Míriam Mulero, Elisabeth González García, Carolina Burgos, Cinta Estrada i Rosa Senán

Les mossegades més habituals són de gossos, però també poden ser de gats, rosegadors o serps. I també, humanes. Poden causar infeccions locals i generals, sobretot quan la mossegada és a les mans o als braços, o si afecten a menors de 2 anys, a majors de 50 o a persones malaltes.

És important tenir els **cartells vacunals** actualitzats: els nostres i els de les mascotes. Cal que els adults i els infants sàpiguen tractar els animals, que evitin molestar-los i el contacte amb animals desconeguts. Al camp, cal anar ben calçats, i s'ha de vigilar quan es belluguen pedres o quan seiem.

Què cal fer en cas de mossegada?

Mantingueu la calma i poseu-vos a resguard de l'animal o de l'agressor. Netegeu la ferida al més aviat possible, amb aigua abundant i sabó, o bé amb una solució salina estèril, durant 5 minuts. Si patiu hemorràgia, premeu durant uns 10 minuts, per aturar-la. Tapeu la mossegada amb un apòsit estèril. Mantingueu aixecat el membre afectat i immobilitzeu-lo per ajudar a baixar la inflamació. Poseu-hi gel. Consulteu el vostre metge o metgessa si la mossegada sembla infectada, si us trobeu malament, també si patiu diabetis o malalties greus, o si la ferida és profunda. Cal que

reviseu l'estat de la vacunació antitetànica. No sempre caldran antibiòtics: el metge o metgessa ho valorarà.

Les mossegades de serp

Es tracta d'una emergència mèdica. Demaneu ajuda i intenteu arribar a l'hospital més proper tan aviat com pugueu. La majoria de serps de Catalunya no són verinoses, però algunes, com l'escurçó, sí que ho són. Convé identificar l'espècie o poder descriure-la. La colobra no és verinosa i deixa una mossegada en forma de lletra *u*. L'escurçó, que sí que ho és, deixa marques d'ullals.

Mantingueu la part afectada en la posició més baixa possible respecte a la resta del cos. No hi apliqueu fred ni calor. No feu cap torniquet, excepte si sabeu que l'atenció hospitalària es demorarà més d'una hora i l'espècie ha estat identificada com a molt perillosa. Cal anotar l'hora en què s'ha fet el torniquet i només és útil si s'ha fet en els primers 15-20 minuts. No pot comprimir excessivament i cal aflluixar-lo cada 15 minuts. No es pot mantenir més de 2-3 hores. No tal·leu ni xucleu mai la mossegada.

La ràbia

La vacuna de la ràbia és obligatòria per a tots els gossos a tota Espanya, excepte a Galícia, País Basc i Catalunya. Actualment, a Espanya (tret de Ceuta i Melilla) no hi ha ràbia. En cas de mossegada d'un gos domèstic ben vacunat la transmissió de la malaltia és pràcticament impossible. És possible en cas de mossegada d'un gos no vacunat o salvatge; si se'l pot agafar, es mantindrà en observació veterinària durant 10 dies i la víctima seguirà un tractament preventiu. Si no s'ha pogut agafar el gos, el seu metge o metgessa valorarà si cal tractament preventiu.



Com citar l'article:

Martínez Carmona S, Mulero M, González García E, Burgos C, Estrada C, Senán R. Mossegades. But At Prim Cat 2020;38:22.